

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER**

Levofloxacin EG 500 mg filmomhulde tabletten  
Levofloxacinhemihydraat

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Levofloxacin EG 500 mg en waarvoor wordt dit middel ingenomen?
2. Wanneer mag u Levofloxacin EG 500 mg niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Levofloxacin EG 500 mg in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Levofloxacin EG 500 mg?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is Levofloxacin EG 500 mg en waarvoor wordt dit middel ingenomen?**

De naam van uw geneesmiddel is Levofloxacin EG 500 mg. Levofloxacin EG 500 mg bevat een geneesmiddel dat levofloxacin wordt genoemd. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die antibiotica worden genoemd. Levofloxacin is een antibioticum van de klasse van de 'chinolonen'. Het werkt door de bacteriën te doden die infecties veroorzaken in uw lichaam.

Levofloxacin EG 500 mg kan gebruikt worden om infecties te behandelen van:

- De bijholten van de neus
- De longen, bij mensen met langdurige ademhalingsproblemen of longontsteking
- De urinewegen, waaronder de nieren en de blaas
- De prostaat, als u een aanhoudende infectie heeft
- De huid en onderhuidse weefsels waaronder de spieren. Men spreekt soms van "weke delen".

In sommige speciale situaties kan Levofloxacin EG 500 mg gebruikt worden om het risico te verminderen dat u een longziekte krijgt, miltvuur genoemd, of een verergering van de ziekte nadat u bent blootgesteld aan de bacterie die miltvuur veroorzaakt.

### **2. Wanneer mag u Levofloxacin EG 500 mg niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u Levofloxacin EG 500 mg niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor levofloxacin, voor andere ‘chinolone’ antibiotica zoals moxifloxacin, ciprofloxacin of ofloxacin, of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- Verschijnselen van een allergische reactie zijn onder meer: huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong.
- U heeft ooit epilepsie gehad.
- U heeft ooit problemen gehad met uw pezen, bijvoorbeeld tendinitis die verband hield met de behandeling met een ‘chinolone’ antibioticum. Een pees is de streng die uw spier verbindt met uw skelet.
- U bent een kind of groeiende tiener.
- U bent zwanger, u kunt zwanger worden of denkt dat u zwanger bent.
- U geeft borstvoeding.

Neem dit geneesmiddel niet in als één van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Levofloxacin EG 500 mg inneemt.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Levofloxacin EG 500 mg?**

#### **Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Levofloxacin EG 500 mg inneemt:**

- als u 60 jaar of ouder bent
- als u corticosteroïden gebruikt, soms steroïden genoemd (zie de rubriek “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”)
- als u ooit een epileptische aanval (convulsies) heeft gehad
- als u hersenletsel heeft gehad als gevolg van een beroerte (CVA) of een ander hersentrauma
- als u nierproblemen heeft
- als u lijdt aan een aandoening bekend als ‘glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie’. U heeft meer kans op ernstige problemen met uw bloed als u dit geneesmiddel gebruikt
- als u ooit mentale gezondheidsproblemen heeft gehad
- als u ooit hartproblemen heeft gehad: voorzichtigheid is vereist bij gebruik van dit soort geneesmiddelen, als u geboren werd met of een familiale voorgeschiedenis heeft van verlengd QT-interval (waargenomen op het ECG, de elektrische registratie van het hart), als u een verstoord zoutevenwicht in het bloed heeft (in het bijzonder een lage kalium- of magnesiumspiegel in het bloed), als u een zeer traag hartritme heeft (‘bradycardie’ genoemd), als u een zwak hart (hartfalen) heeft, als u een voorgeschiedenis van een hartaanval (myocardinfarct) heeft, als u een vrouw of een oudere persoon bent of als u andere geneesmiddelen inneemt die leiden tot abnormale ECG-veranderingen (zie de rubriek “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”)
- als u suikerziekte (diabetes) heeft
- als u ooit leverproblemen heeft gehad
- als u aan myasthenia gravis lijdt

Wanneer u niet zeker bent of één van de bovenstaande punten op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u Levofloxacin EG 500 mg inneemt.

### **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

Neemt u naast Levofloxacin EG 500 mg nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. De reden hiervoor is dat Levofloxacin EG 500 mg invloed kan hebben op de manier waarop andere geneesmiddelen werken. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen invloed hebben op de manier waarop Levofloxacin EG 500 mg werkt.

**Het is vooral belangrijk uw arts te informeren als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Deze kunnen namelijk de kans op bijwerkingen verhogen indien ze samen met Levofloxacin EG 500 mg worden gebruikt:**

- Corticosteroïden, soms steroïden genoemd – gebruikt voor ontsteking. Het risico op een ontsteking en/of scheur van uw pezen kan verhoogd zijn.
- Warfarine – gebruikt om het bloed te verdunnen. Het risico op bloedingen is verhoogd. Uw arts kan het nodig achten om regelmatig bloedtesten uit te voeren om te controleren hoe goed uw bloed kan stollen.
- Theofylline – gebruikt voor ademhalingsproblemen. U loopt meer risico op een epileptische aanval (convulsies) indien dit geneesmiddel samen met Levofloxacin EG 500 mg wordt ingenomen.
- Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) – gebruikt voor pijn en ontsteking, zoals acetylsalicylzuur, ibuprofen, fenbufen, ketoprofen en indomethacine. U loopt een hoger risico op een epileptische aanval (convulsies) indien dit geneesmiddel samen met Levofloxacin EG 500 mg wordt ingenomen.
- Ciclosporine – gebruikt na orgaantransplantaties. U heeft meer risico om de bijwerkingen van ciclosporine te krijgen.
- Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze invloed hebben op de manier waarop uw hart klopt. Dit zijn onder meer geneesmiddelen die gebruikt worden voor een abnormaal hartritme (antiaritmica zoals kinidine, hydrokinidine, disopyramide, sotalol, dofetilide, ibutilide en amiodaron), depressie (tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline en imipramine), psychische stoornissen (antipsychotica) en bacteriële infecties ('macrolide' antibiotica zoals erythromycine, azithromycine en clarithromycine).
- Probenecide – gebruikt voor jicht, en cimetidine – gebruikt voor maagzweren en zuurbranden. Extra voorzichtigheid is vereist wanneer één van deze geneesmiddelen samen met Levofloxacin EG 500 mg wordt ingenomen. Uw arts kan het nodig achten u een lagere dosis voor te schrijven als u nierproblemen heeft.

**Neem Levofloxacin EG 500 mg niet gelijktijdig in met de volgende geneesmiddelen. Deze kunnen namelijk de werking van Levofloxacin EG 500 mg beïnvloeden:**

- IJzertabletten (voor anemie), zinksupplementen, magnesium- of aluminiumbevattende antacida (voor zuur of zuurbranden), didanosine of sucralfaat (voor maagzweren). Zie rubriek 3 hieronder "Als u reeds ijzertabletten, zinksupplementen, antacida, didanosine of sucralfaat inneemt".

### **Urinetesten voor opiaten**

Urinetesten kunnen 'vals-positieve' resultaten geven voor sterke pijnstillers, 'opiaten' genoemd, bij mensen die Levofloxacin EG 500 mg innemen. Als uw arts een urinetest moet uitvoeren, vertel hem/haar dan dat u Levofloxacin EG 500 mg gebruikt.

### **Tuberculusetesten**

Dit geneesmiddel kan 'vals-negatieve' resultaten geven voor sommige laboratoriumtesten die gebruikt worden om de bacterie op te sporen die tuberculose veroorzaakt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Gebruik dit geneesmiddel niet:

- als u zwanger bent, zwanger kunt worden, of denkt dat u zwanger bent
- als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

U kunt bijwerkingen krijgen nadat u dit geneesmiddel heeft ingenomen. Deze bijwerkingen omvatten duizeligheid, slaperigheid, een gevoel van draaierigheid (vertigo) of veranderingen van uw zicht. Sommige van deze bijwerkingen kunnen invloed hebben op uw concentratievermogen en uw reactiesnelheid. Als dit het geval is, bestuur dan geen voertuig of doe geen activiteiten die veel aandacht eisen.

### **Stoffen in Levofloxacin EG 500 mg waarmee u rekening moet houden**

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Levofloxacin EG 500 mg inneemt.

### **3. Hoe neemt u Levofloxacin EG 500 mg in?**

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **Inname van dit geneesmiddel**

- Neem dit geneesmiddel in via de mond.
- Slik de tabletten in hun geheel in met een glas water.
- De tabletten mogen zowel tijdens de maaltijden als op elk moment tussen de maaltijden worden ingenomen.

#### **Bescherm uw huid tegen zonlicht**

Vermijd direct zonlicht terwijl u dit geneesmiddel inneemt en gedurende 2 dagen nadat u gestopt bent met de inname ervan. De reden hiervoor is dat uw huid gevoeliger zal worden voor de zon; dit kan aanleiding geven tot brandwonden, tintelingen en ernstige blaren als u de volgende voorzorgen niet neemt:

- Zorg ervoor dat u een zonnecrème met hoge beschermingsfactor gebruikt.
- Draag steeds een hoed en kleren die uw armen en benen bedekken.
- Vermijd zonnebanken.

#### **Als u reeds ijzertabletten, zinksupplementen, antacida, didanosine of sucralfaat inneemt**

- Neem deze geneesmiddelen niet tegelijk in met Levofloxacin EG 500 mg. Neem uw dosis van deze geneesmiddelen minstens 2 uur voor of na Levofloxacin EG 500 mg.

#### **Hoeveel moet u innemen**

- Uw arts zal beslissen hoeveel Levofloxacin EG 500 mg tabletten u moet innemen.
- De dosis zal afhangen van het type infectie en de plaats van de infectie in uw lichaam.
- De behandelingsduur zal afhangen van de ernst van de infectie.
- Als u denkt dat het effect van uw geneesmiddel te zwak of te sterk is, verander dan de dosis niet zelf, maar raadpleeg uw arts.

#### **Volwassenen en ouderen**

##### **Ontsteking van de bijholten van de neus**

Twee tabletten van Levofloxacin EG 250 mg, eenmaal per dag  
Of één tablet van Levofloxacin EG 500 mg, eenmaal per dag

##### **Infectie van de longen bij mensen met chronische ademhalingsproblemen**

Twee tabletten van Levofloxacin EG 250 mg, eenmaal per dag  
Of één tablet van Levofloxacin EG 500 mg, eenmaal per dag

### **Longontsteking**

Twee tabletten van Levofloxacin EG 250 mg, een- of tweemaal per dag  
Of één tablet van Levofloxacin EG 500 mg, een- of tweemaal per dag

### **Infectie van de urinewegen waaronder uw nieren of blaas**

Eén of twee tabletten van Levofloxacin EG 250 mg, eenmaal per dag  
Of ½ of één tablet van Levofloxacin EG 500 mg, eenmaal per dag

### **Prostaatinfectie**

Twee tabletten van Levofloxacin EG 250 mg, eenmaal per dag  
Of één tablet van Levofloxacin EG 500 mg, eenmaal per dag

### **Infectie van de huid en onderhuidse weefsels, waaronder de spieren**

Twee tabletten van Levofloxacin EG 250 mg, een- of tweemaal per dag  
Of één tablet van Levofloxacin EG 500 mg, een- of tweemaal per dag

### **Volwassenen en ouderen met nierproblemen**

Uw arts kan het nodig achten om u een lagere dosis te geven.

### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Dit geneesmiddel mag niet toegediend worden aan kinderen of tieners.

### **Heeft u te veel van Levofloxacin EG 500 mg ingenomen?**

Wanneer u per ongeluk te veel Levofloxacin EG 500 mg tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245). Neem de verpakking van het geneesmiddel mee. Zo kan de arts zien wat u heeft ingenomen. De volgende effecten kunnen optreden: epileptische aanvallen, een gevoel van verwardheid, duizeligheid, verminderd bewustzijn, bevingen en hartproblemen die leiden tot een onregelmatige hartslag, misselijkheid of een brandend gevoel in de maag.

### **Bent u vergeten Levofloxacin EG 500 mg in te nemen?**

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem ze dan in zo snel als u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het innemen van Levofloxacin EG 500 mg**

Stop Levofloxacin EG 500 mg niet zomaar omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de kuur die uw arts u heeft voorgeschreven, volledig afmaakt. Als u te snel stopt met de inname van de tabletten, kan de infectie terugkeren, kan uw aandoening verslechteren of kan de bacterie resistent worden tegen het geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Deze bijwerkingen zijn meestal licht tot matig en verdwijnen vaak na korte tijd.

**Stop met het innemen van Levofloxacin EG 500 mg en raadpleeg onmiddellijk een arts of ga meteen naar het ziekenhuis als u de volgende bijwerking waarneemt:**

**Zeer zelden** (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen)

- U kunt een allergische reactie krijgen. De verschijnselen kunnen omvatten: huiduitslag, slik- of ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de lippen, het gezicht, de keel of de tong.

**Stop met het innemen van Levofloxacin EG 500 mg en raadpleeg onmiddellijk een arts als u één van de volgende ernstige bijwerkingen waarneemt – u kunt een dringende medische behandeling nodig hebben:**

**Zelden** (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen)

- Waterige diarree die bloed kan bevatten, eventueel gepaard gaand met maagkrampen en koorts. Dit kunnen verschijnselen zijn van een ernstig probleem met uw darmen.
- Pijn en ontsteking van de pezen of gewrichtsbanden, die kan leiden tot een scheur. De achillespees is het vaakst getroffen.
- Epileptische aanvallen (convulsies)

**Zeer zelden** (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen)

- Een brandend, tintelend gevoel, pijn of een gevoel van verdoving. Dit kunnen verschijnselen zijn van een zogenaamde ‘neuropathie’.

**Andere:**

- Ernstige huiduitslag die kan omvatten: blaarvorming of afschilfering van de huid rond de lippen, de ogen, de mond, de neus en de geslachtsdelen.
- Verlies van eetlust, gele verkleuring van de huid en de ogen, donkergekleurde urine, jeuk of gevoelige maag (buik). Dit kan wijzen op leverproblemen waaronder fataal leverfalen.

Indien uw zicht vermindert of indien u enig ander oogprobleem ervaart gedurende de behandeling met Levofloxacin EG 500 mg, raadpleeg dan onmiddellijk een oogarts.

**Raadpleeg uw arts als één van de volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan enkele dagen duurt:**

**Vaak** (kan tot 1 op 10 mensen treffen)

- Slaapproblemen
- Hoofdpijn, een gevoel van duizeligheid
- Zich ziek voelen (misselijkheid, braken) en diarree
- Stijging van het gehalte van sommige leverenzymen in uw bloed

**Soms** (kan tot 1 op 100 mensen treffen)

- Verandering in het aantal van andere bacteriën of schimmels, infectie met de schimmel Candida, wat een behandeling kan vereisen
- Verandering in het aantal witte bloedcellen, aangetoond in de resultaten van sommige bloedtesten (leukopenie, eosinofilie)
- Zich gespannen voelen (angstig), zich verward voelen, een gevoel van zenuwachtigheid, een gevoel van slaperigheid, bevingen, een gevoel van draaierigheid (vertigo)
- Kortademigheid (dyspneu)
- Verandering in de manier waarop dingen smaken, verlies van eetlust, last van de maag of spijsverteringsproblemen, pijn in de maagstreek, een opgeblazen gevoel (flatulentie) of constipatie
- Jeuk en huiduitslag, ernstige jeuk of netelroos (urticaria), te veel zweten (hyperhidrose)
- Gewrichtspijn of spierpijn
- Bloedtesten kunnen ongewone resultaten geven als gevolg van leverproblemen (bilirubine verhoogd) of nierproblemen (creatinine verhoogd)
- Algemene zwakte

**Zelden** (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen)

- Gemakkelijk blauwe plekken hebben en bloeden als gevolg van een daling van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- Laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
- Overdreven immuunrespons (overgevoeligheid)
- Verlaging van de bloedsuikerspiegel (hypoglykemie). Dit is belangrijk voor mensen die suikerziekte hebben.
- Dingen zien of horen die er niet zijn (hallucinaties, paranoia), verandering in uw mening en gedachten (psychotische reacties) met een risico op de ontwikkeling van zelfmoordgedachten of zelfmoorddadens
- Een gevoel van depressie, mentale problemen, een gevoel van rusteloosheid (agitatie), abnormale dromen of nachtmerries
- Een tintelend gevoel in handen en voeten (paresthesie)
- Problemen met uw gehoor (tinnitus) of zicht (wazig zicht)
- Ongewoon snelle hartslag (tachycardie) of een lage bloeddruk (hypotensie)
- Spierzwakte. Dit is belangrijk voor mensen met myasthenia gravis (een zeldzame ziekte van het zenuwstelsel).
- Veranderingen in de manier waarop uw nieren werken en soms nierfalen die te wijten kan zijn aan een allergische nierreactie, interstitiële nefritis genoemd.
- Koorts

**Andere bijwerkingen omvatten:**

- Daling van het aantal rode bloedcellen (anemie). Hierdoor kan uw huid er bleek of geel uitzien als gevolg van een beschadiging van de rode bloedcellen; een daling van alle types bloedcellen (pancytopenie)
- Koorts, keelpijn en een algemeen gevoel van onwelzijn dat niet verdwijnt. Dit kan te wijten zijn aan een daling van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose).
- Circulatiestilstand (anafylactische shock)
- Verhoging van de bloedsuikerspiegel (hyperglykemie) of verlaging van de bloedsuikerspiegel die leidt tot coma (hypoglykemisch coma). Dit is belangrijk voor mensen die suikerziekte hebben.
- Veranderingen in de manier waarop dingen ruiken, verlies van reukzin of smaakzin (parosmie, anosmie, ageusie)
- Problemen met bewegen en lopen (dyskinesie, extrapiramidale stoornissen)
- Tijdelijk verlies van bewustzijn of houding (syncope)
- Tijdelijk verlies van zicht
- Verslechterd gehoor of gehoorverlies
- Abnormaal snel hartritme, levensbedreigend onregelmatig hartritme, inclusief hartstilstand, verstoring van het hartritme ('verlenging van het QT-interval' genoemd, waargenomen op het ECG, de elektrische activiteit van het hart)
- Ademhalingsmoeilijkheden of piepende ademhaling (bronchospasme)
- Allergische longreacties
- Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
- Ontsteking van de lever (hepatitis)
- Verhoogde gevoeligheid van de huid voor de zon en ultraviolette stralen (fotosensibiliteit)
- Ontsteking van de bloedvaten die het bloed transporteren in uw lichaam als gevolg van een allergische reactie (vasculitis)
- Ontsteking van het weefsel in de mond (stomatitis)
- Spierscheur en spierdestructie (rabdomyolyse)
- Roodheid en zwelling van de gewrichten (arthritis)
- Pijn waaronder rugpijn, borstpijn en pijn in de ledematen
- Aanvallen van porfyrie bij mensen die reeds porfyrie hebben (een zeer zeldzame metabole ziekte)

- Aanhoudende hoofdpijn, al dan niet gepaard gaande met wazig zicht (goedaardige intracraniale hypertensie)

### Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u Levofloxacin EG 500 mg?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Levofloxacin EG 500 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op de blisterverpakking na "EXP". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

### **Bewaaromstandigheden:**

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities, maar u bewaart de tabletten het best in de oorspronkelijke doordrukstrips en de doos op een droge plaats.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in Levofloxacin EG 500 mg?**

De werkzame stof in dit middel is levofloxacinemihydraat.

1 filmomhulde tablet bevat 512,46 mg levofloxacinemihydraat, wat overeenkomt met 500 mg levofloxacin.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

Microkristallijne cellulose type 102, gepoederde cellulose, gepregelatiniseerd zetmeel (zetmeel van graan), maïszetmeel, crospovidon type A, povidon K25, natriumstearylfumaraat

Filmomhulling:

Lactosemonohydraat, hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 4000, geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172) en zwart ijzeroxide (E172)

### **Hoe ziet Levofloxacin EG 500 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Levofloxacin EG 500 mg is een roze, langwerpige filmomhulde tablet met een breukstreep op elke zijde. De filmomhulde tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Levofloxacin EG 500 mg is beschikbaar in verpakkingen met 2, 5, 7, 10, 20, 30 en 50 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Eurogenerics NV – Heizel Esplanade b 22 – 1020 Brussel



## **Fabrikanten**

STADA Arzneimittel AG - Stadastraße 2 – 18 - 61118 Bad Vilbel - Duitsland  
STADA Production Ireland - Waterford Road – Clonmel - Co. Tipperary – Ierland  
Centrafarm Services B.V. - Nieuw Donk 9 - Postbus 289 - 4879 AG Etten-Leur – Nederland  
Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel – België  
Genus Pharmaceuticals Ltd. - Park View House 65 London Road – Newbury Berkshire RG14 1JN-  
Verenigd Koninkrijk  
Medinsa - Laboratorios Medicamentos Internacionales, S. A. - Solana, 26 - 28850 Torrejón de Ardoz  
(Madrid) - Spanje  
PharmaCoDane ApS - Marielundvej 46 A - 2730 Herlev Copenhagen - Denemarken

### **Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:**

Oostenrijk: Flevoxasan 500 mg Filmtabletten  
België: Levofloxacin EG 500 mg, filmomhulde tabletten  
Bulgarije: *Vivex* 500 mg filmcoated tablets  
Italië: LEVOFLOXACINA EG 500 mg compresse rivestite con film  
Luxemburg: Levofloxacin EG 500 mg, comprimés pelliculés  
Nederland: Levofloxacin STADA 500 mg, filmomhulde tabletten

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** BE379863

**Afleveringswijze:** op medisch voorschrift

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2018.**