

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

**Alprazolam EG 0,25 mg tabletten**  
**Alprazolam EG 0,5 mg tabletten**  
**Alprazolam EG 1 mg tabletten**  
**Alprazolam EG 2 mg tabletten**

Alprazolam

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.**

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Alprazolam EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Alprazolam EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Alprazolam EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Alprazolam EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. Wat is Alprazolam EG en waarvoor wordt het ingenomen?**

Alprazolam behoort tot de groep van de benzodiazepinen.

Alprazolam EG is aangewezen bij de behandeling van angst- en spanningstoestanden. Het kan ook gebruikt worden bij de behandeling van bepaalde paniekt toestanden met of zonder agorafobie (pleinvrees).

### **2. Wanneer mag u Alprazolam EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?**

#### **Wanneer mag u Alprazolam EG niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Alprazolam EG mag niet gebruikt worden door patiënten die overgevoelig zijn voor benzodiazepinen en bij patiënten met myasthenia gravis (een ernstige vorm van spierzwakte).
- Het gebruik van Alprazolam EG is ook niet aangewezen bij patiënten met ernstige ademhalingsstoornissen, slaapapneusyndroom (tijdelijke ademhalingsstop gedurende de slaap), en ernstig leverlijden.
- Alprazolam EG is enkel onderzocht bij patiënten ouder dan 18 jaar. Alprazolam EG werd niet onderzocht bij kinderen, daarom zal Alprazolam EG niet worden toegediend aan kinderen.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Alprazolam EG?**

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Alprazolam EG inneemt.

- De behandeling mag niet plotseling worden onderbroken, maar dient steeds in overleg met uw arts geleidelijk te worden afgebouwd.
- Mocht u lijden aan glaucoom (groene staar), breng dan uw arts hiervan op de hoogte.

- Neerslachtige patiënten met zelfmoordneigingen dienen onder verscherpte controle van de arts te staan.
- Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de werking van Alprazolam EG, namelijk sufheid, versterken. Alcohol wordt daarom ontraden bij gebruik van Alprazolam EG.
- Alprazolam EG kan geheugenstoornissen veroorzaken. Om dit risico te verminderen is het aangeraden 7 tot 8 uur ononderbroken te slapen na de inname.
- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Benzodiazepines en aanverwante producten dienen met voorzichtigheid te worden gebruikt bij bejaarden wegens het risico op sedatie en/of zwakte van het skeletspierstelsel die het vallen kunnen bevorderen, vaak met ernstige gevolgen bij deze populatie.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

### **Kinderen en jongeren tot 18 jaar**

Alprazolam wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Benzodiazepinen zijn niet aangewezen bij kinderen onder de zes jaar.

Geef Alprazolam EG niet aan kinderen.

### **Neemt u nog andere geneesmiddelen in?**

Neemt u naast Alprazolam EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Benzodiazepinen, waaronder alprazolam, veroorzaken een additief onderdrukkend effect op het centraal zenuwstelsel (CZS) indien samen gebruikt met andere psychotropen, anticonvulsiva (geneesmiddelen tegen stuipen), antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie) en andere middelen die werkzaam zijn op het centraal zenuwstelsel.

Volgende geneesmiddelen kunnen het effect van alprazolam eveneens verhogen:

- orale contraceptiva
- macrolide antibiotica zoals erythromycine en clarithromycine
- cimetidine (geneesmiddel dat de afscheiding van maagzuur vermindert)

Vertel daarom steeds uw arts welke geneesmiddelen u gebruikt.

### **Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?**

Gelijktijdig gebruik van alcohol kan de werking van benzodiazepinen, namelijk sufheid, versterken. Alcohol wordt daarom ook ontraden bij gebruik van Alprazolam EG.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

#### Zwangerschap

Het gebruik van benzodiazepinen is af te raden tijdens de zwangerschap, behalve onder strikte controle van de arts.

#### Borstvoeding

Het gebruik van benzodiazepinen is af te raden tijdens de periode van borstvoeding.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Daar benzodiazepinen het reactievermogen (namelijk de snelheid om te reageren) kunnen beïnvloeden, is voorzichtigheid geboden bij het besturen van voertuigen en gebruik van bepaalde machines.

### **Alprazolam EG bevat lactose**

Dit geneesmiddel bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

## **3. Hoe neemt u Alprazolam EG in?**

Neem Alprazolam EG altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Alprazolam EG tabletten wordt ingeslikt.

De arts die Alprazolam EG heeft voorgeschreven, bepaalt hoeveel tabletten u per dag moet gebruiken en op welk tijdstip u ze dient in te nemen.

De behandeling mag niet plotseling worden onderbroken, maar dient steeds in overleg geleidelijk te worden afgebouwd.

Behandeling van angst- en spanningstoestanden:

De gebruikelijke dosis (hoeveelheid) voor patiënten ouder dan 18 jaar bedraagt 0,25 mg tot 0,5 mg driemaal daags tot een maximum van 4 mg per dag. Speciaal bij ouderen en verzwakte patiënten dient de dosis echter te worden beperkt tot de kleinst mogelijke werkzame hoeveelheid, b.v. 0,25 mg twee tot driemaal daags.

Behandeling van paniektoestanden:

Bij bepaalde paniektoestanden wordt Alprazolam EG gebruikt in doses die zeer sterk uiteenlopen en die in samenspraak met uw arts moeten worden bepaald, mede op basis van de niet-medicamenteuze aanpak van het probleem. De dosis kan de 4 mg per dag overschrijden. Daarom kan het vaak gebeuren dat 3 à 4 toedieningen per dag worden voorgeschreven.

In geval u bemerkt dat Alprazolam EG te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

### **Heeft u te veel van Alprazolam EG ingenomen?**

Wanneer u te veel van Alprazolam EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Geef de patiënt niet te drinken indien hij niet 100% bij bewustzijn is.

### **Bent u vergeten Alprazolam EG in te nemen?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het innemen van Alprazolam EG**

Vooraf bij patiënten behandeld met hoge doses kunnen bij plots stoppen van de behandeling onttrekkingsverschijnselen zoals humeurigheid, slapeloosheid, krampen, braakneigingen, zweten, stuipen en delirium voorkomen. Een geleidelijke afbouw van de dosering in samenspraak met uw arts helpt deze reacties te voorkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **4. Mogelijke bijwerkingen**

Zoals elk geneesmiddel kan ook Alprazolam EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

##### Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Niet bekend: tekort aan witte bloedcellen

##### Endocriene aandoeningen

Soms: verhoogde aanwezigheid van het hormoon prolactine

##### Psychische stoornissen

Vaak: verwardheid, depressie

Soms: hallucinaties, woede, agressief gedrag, vijandig gedrag, angst, agitatie, gewijzigd libido, slapeloosheid, abnormale gedachten, zenuwachtigheid, stimulering

##### Zenuwstelselaandoeningen

Zeer vaak: sedatie, slaperigheid

Vaak: geheugenstoornissen, hoofdpijn, stoornissen in de coördinatie van bewegingen, spraakstoornissen, ijlhoofdigheid, duizeligheid, concentratiestoornissen

Soms: beven

Niet bekend: vermoeidheid, epilepsie, tekenen van paranoia en zelfvervreemding (Raadpleeg in dit geval uw arts)

##### Oogaandoeningen

Vaak: troebel zicht

Soms: verhoogde druk in het oog

##### Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Niet bekend: ademhalingsproblemen

##### Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: misselijkheid, verstopping

Soms: braken

##### Lever- en galaandoeningen

Soms: abnormale leverfunctie, geelzucht

Niet bekend: hepatitis (ontsteking van de lever)

##### Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: huidreacties

##### Nier- en urinewegaandoeningen

Soms: onvermogen om de urine op te houden of te urineren

##### Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen

Soms: seksuele disfunctie, onregelmatige maandstonden, gynaecomastie (vergroting van het borstklierweefsel)

##### Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: algemene zwakte, prikkelbaarheid

Niet bekend: vochtophoping, allergische reacties, anafylaxie

##### Onderzoeken

Soms: veranderingen in het gewicht

### Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Vaak: verminderde eetlust

### Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen

Soms: spierzwakte

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. Hoe bewaart u Alprazolam EG?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

### Alprazolam EG 0,25 mg

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

### Alprazolam EG 0,5 mg - Alprazolam EG 1 mg - Alprazolam EG 2 mg

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Alprazolam EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. Inhoud van de verpakking en overige informatie**

### **Welke stoffen zitten er in Alprazolam EG?**

De werkzame stof in Alprazolam EG is alprazolam, overeenkomend met respectievelijk 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg of 2 mg alprazolam.

De andere stoffen in Alprazolam EG zijn:

#### Alprazolam EG 0,25 mg tabletten:

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat

#### Alprazolam EG 0,5 mg tabletten:

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat – Erythrozine (E127)

#### Alprazolam EG 1 mg tabletten:

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat – Indigotine (E132)

#### Alprazolam EG 2 mg tabletten:

Lactosemonohydraat – Microkristallijne cellulose – Natrium docusaat – Natriumbenzoaat (E211) – Colloïdaal watervrij siliciumdioxide – Gepregelatiniseerd zetmeel – Magnesiumstearaat

**Hoe ziet Alprazolam EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Deelbare tabletten voor orale inname. De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Verpakkingen met 20, 50, 60, 90, 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

**Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen*

Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel

*Fabrikant*

Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout

**Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:**

Alprazolam EG 0,25 mg tabletten: BE205317

Alprazolam EG 0,5 mg tabletten: BE205326

Alprazolam EG 1 mg tabletten: BE205335

Alprazolam EG 2 mg tabletten: BE205344

**Afleveringswijze:** op medisch voorschrift

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd/herzien in 03/2016 / 02/2016.**