

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Propranolol EG 40 mg tabletten Propranolol EG Retard 160 mg capsules met verlengde afgifte Propranololhydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Propranolol EG en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Propranolol EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Propranolol EG?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Propranolol EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Propranolol EG en waarvoor wordt het gebruikt?

De geneesmiddelengroep: Bètablokker.

Therapeutische indicaties:

- Propranolol EG is aangewezen bij de behandeling van hoge bloeddruk. Bij hartkramp worden de tabletten gebruikt als onderhoudsbehandeling. De tabletten zijn niet aangewezen voor de onmiddellijke behandeling van een plots optredende crisis.
- Behandeling van hartritmestoornissen.
- Behandeling van een bepaald type hartspieraandoening, waarbij de spieren in de wand van het hart toegenomen zijn.
- Preventieve behandeling op lange termijn na een acuut hartinfarct.
- Behandeling van beven wanneer de gebruikelijke behandelingen zonder resultaat blijven.
- Behandeling van hartkloppingen bij angst.
- Hulpmiddel bij de behandeling van schildklierandoeningen (thyreotoxicosis).
- Hulpmiddel bij de tijdelijke behandeling van een gezwel van het bijniermerg (feochromocytoom).
- Preventieve behandeling van migraine bij patiënten met vier of meer aanvallen per maand.
- Primaire en secundaire preventieve behandeling van bloedingen in het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal bij patiënten met hoge bloeddruk te wijten aan een leveraandoening en matige tot ernstige varices ter hoogte van de slokdarm.

2. Wanneer mag u Propranolol EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Propranolol EG niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- Indien u ooit astma of een piepende ademhaling had.

- Indien u lijdt aan of hebt geleden aan een hartaandoening waaronder hartfalen (onvoldoende werking van het hart die niet onder controle is) of een shock te wijten aan een hartafwijking.
- Indien u ooit een zeer trage (minder dan 45 slagen per minuut) of een zeer onregelmatige polsslag had.
- Indien u ooit een zeer lage bloeddruk of een zeer slechte bloedsomloop had.
- Indien men u ooit verwittigde dat u lijdt aan een bijzonder type van hartkramp (type Prinzmetal angor).
- Indien u een gezwel van het bijniermerg heeft (feochromocytoom), dat nog niet met andere geneesmiddelen wordt behandeld.
- Indien u gedurende lange tijd niet gegeten heeft.
- Indien u een zuurtevergiftiging te wijten aan stofwisselingsafwijkingen heeft (vb. bij suikerziekte).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Propranolol EG?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Propranolol EG gebruikt.

- indien u problemen heeft met uw nieren, lever, schildklier, bloedsomloop, hart, ademhaling (ademnood) of suikerspiegel of indien u last heeft van gezwollen enkels
- bij een daling van de polsslag tot 45 slagen per minuut of minder. Dit is een aanwijzing om onmiddellijk de huisarts te raadplegen.
- indien u suikerziekte heeft. Propranolol EG kan de reactie op insuline of andere behandelingen voor suikerziekte wijzigen. Propranolol EG kan soms ook de reactie van het lichaam op een laag suikergehalte in het bloed wijzigen. Zo kunnen tekenen van een daling van het suikergehalte in het bloed (zoals snellere hartslag) minder goed waar te nemen zijn. Zeer zelden kan het suikergehalte in het bloed naar een zeer laag niveau dalen en leiden tot stuipen of coma. Bij patiënten die insuline gebruiken, kan een aanpassing van de normale dosis noodzakelijk blijken. Soms kan Propranolol EG leiden tot lage bloedsuikerwaarden bij patiënten die niet aan suikerziekte lijden, zoals bij pasgeborenen, kleuters, kinderen, oudere patiënten, patiënten behandeld met de kunstmatige nier (hemodialyse) of patiënten met een chronische leverziekte en patiënten met een overdosis.
- indien u een aandoening van de bloedvaten heeft
- indien u lijdt aan schildklierziekten. De tekens van schildklierziekten (thyreotoxicosis) kunnen minder goed waar te nemen zijn.
- indien u een onvoldoende werking van lever en nieren heeft. Bij deze patiënten moeten de startdosis en de daaropvolgende dosissen meestal verminderd worden. Patiënten met bepaalde leverziekten (levercirrose die niet onder controle is, en bij hoge bloeddruk te wijten aan een leverziekte) moeten van dichtbij gevolgd worden tijdens hun behandeling met bètablokkers.
- indien u ooit een allergische reactie vertoonde na bijvoorbeeld een insectenbeet
- Bij onvoldoende werking van het hart. Propranolol EG mag niet gebruikt worden bij patiënten met een onvoldoende werking van het hart die niet onder controle is.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel, in het bijzonder de anesthesist, verwittigen dat u een behandeling met Propranolol EG volgt.

U mag de behandeling nooit op eigen initiatief stopzetten. Dit mag enkel indien uw arts dit nodig vindt. Het stopzetten mag niet plots maar moet stapsgewijze gebeuren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Propranolol EG nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het nemen van Propranolol EG samen met andere geneesmiddelen kan soms ongewenste uitwerkingen hebben.

Dit kan gebeuren met geneesmiddelen tegen:

- onregelmatige hartslag (o.a. disopyramide, kinidine of propafenon)
- hoge bloeddruk of hartkramp (verapamil, diltiazem, clonidine, nifedipine, amlodipine, nisoldipine, nicardipine, isradipine, lacidipine, hydralazine)
- migraine (ergotamine, clonidine)
- bepaalde geestelijke stoornissen (chlorpromazine of thioridazine)
- pijn en ontsteking (bv. indomethacine, ibuprofen)
- hartfalen (onvoldoende werking van het hart) (digoxine)
- maagaandoeningen (cimetidine)
- verkoudheid of neusverstopping (decongestiva – ontzwellen van de slijmvliezen)
- suikerziekte (orale middelen en insuline)
- tuberculose (rifampicine)
- astma (theofylline)
- bloedstolling (warfarine)

Indien u clonidine neemt, mag u nooit stoppen met het innemen ervan zonder uw arts te raadplegen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Veelvuldig drinken van alcohol kan het effect van Propranolol EG verminderen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Propranolol EG tijdens de zwangerschap is af te raden.

Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van Propranolol EG noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn voorschrift.

Het gebruik van Propranolol EG tijdens de borstvoeding is af te raden.

Indien de arts toch oordeelt dat het gebruik van Propranolol EG noodzakelijk is, volg dan nauwgezet zijn voorschrift.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u last heeft van duizeligheid of vermoeidheid, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines.

Propranolol EG Retard 160 mg capsules met verlengde afgifte bevat sucrose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe gebruikt u Propranolol EG?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Propranolol EG tabletten en capsules dienen bij voorkeur voor de maaltijden ingenomen te worden.
- Een behandeling met bètablokkers mag niet plotseling worden stopgezet bij patiënten met ischemisch (plaatselijk tekort aan bloedtoevoer) hartlijden.
- Dosisaanpassing is noodzakelijk bij onvoldoende werking van de nieren.
- Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te stoppen. Dit moet geleidelijk gebeuren (afbouwen van de behandeling).

VOLWASSENEN:

Hoge bloeddruk:

De startdosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 maal per dag.

De effectieve dosis ligt meestal tussen 120 en 320 mg per dag.

Hartkramp:

20 mg, 4 maal per dag, geleidelijk op te voeren tot 40 mg, 4 maal per dag.

Verdere verhoging tot 240 mg per dag of meer kan nodig zijn. Meestal zijn 2 toedieningen per dag noodzakelijk.

Hartritmestoornissen, hartkloppingen bij angst, hartspieraandoening met toename van de hartspier en schildklieraandoeningen:

De meeste patiënten reageren op een hoeveelheid tussen 10 en 40 mg, 3 à 4 keer per dag.

Preventieve behandeling na een hartinfarct:

De gebruikelijke dosis bedraagt 160 mg.

De behandeling wordt gestart tussen de 5^{de} en 21^{ste} dag na het infarct.

De aanvangsdosis is 40 mg, 3 tot 4 maal per dag gedurende 2 tot 3 dagen. Daarna mag dit vervangen worden door één capsule Propranolol EG Retard 160 mg capsules met verlengde afgifte per dag. Soms zijn hoeveelheden van 180 à 240 mg nodig.

Beven:

De startdosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 keer per dag.

De effectieve dosis bedraagt meestal 80-160 mg per dag.

Gezwel van het bijniermerg:

Voor een operatie: 60 mg per dag (1 ½ tablet Propranolol EG 40 mg tabletten) gedurende 3 dagen.

In niet-opereerbare gevallen: 30 mg (3/4 tablet Propranolol EG 40 mg tabletten) per dag.

Migraine:

Volwassenen:

De startdosis bedraagt 40 mg, 2 à 3 keer per dag.

De patiënt reageert meestal op 80-160 mg per dag.

Gewoonlijk treedt er een verbetering op binnen 4 à 8 weken.

Bloedingen in het bovenste gedeelte van het maagdarmkanaal:

De behandeling mag gestart worden met 20 mg 2 maal per dag.

De dosis dient dan verder verhoogd te worden tot 40 mg 2 maal per dag en 80 mg 2 maal per dag.

Indien nodig mag de dosering verder opgedreven worden tot 160 mg 2 maal per dag.

KINDEREN:

Migraine:

Onder de 12 jaar: de startdosis bedraagt 20 mg, 2 à 3 keer per dag.

De patiënt reageert meestal op 40-80 mg per dag.

Boven de 12 jaar: dezelfde hoeveelheid als volwassenen, hetzij 40 mg, 2 à 3 keer per dag als startdosis.

De patiënt reageert meestal op 80-160 mg per dag.

Aritmieën:

Onder bepaalde omstandigheden kan Propranolol EG gebruikt worden voor de behandeling van kinderen met aritmieën (hartritmestoornissen). De dosering zal door de arts aangepast worden afhankelijk van de leeftijd of het gewicht van het kind.

Wegens gebrek aan actuele gegevens bij kinderen, kunnen voor de overige indicaties geen exacte dosissen vooropgesteld worden.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Propranolol EG moet gebruiken.
Stop de behandeling niet voortijdig.

Heeft u te veel van Propranolol EG gebruikt?

Wanneer u te veel van Propranolol EG heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

De meest voorkomende tekens van overdosering zijn:

- te trage polsslag
- te lage bloeddruk
- benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen

In geval van inname van te grote hoeveelheden, raadpleeg onmiddellijk een geneesheer.

De behandeling van een ernstige overdosering zal in een ziekenhuis plaatshebben.

Te trage polsslag kan tegengegaan worden met atropine 1-2 mg intraveneus. Indien nodig kan dit gevolgd worden door een bolusdosis van glucagon 10 mg, intraveneus.

Een intraveneus infuus van glucagon mag, indien noodzakelijk toegediend worden in een dosis van 1-10 mg/uur afhankelijk van de respons.

Als er echter geen respons komt of indien er geen glucagon binnen het bereik is, mag een bètareceptor-agonist zoals isoprenaline 25 microgram onder de vorm van een trage intraveneuze injectie of dobutamine (2,5 tot 10 µg/kg/minuut) als intraveneuze perfusie toegediend worden.

Bent u vergeten Propranolol EG te gebruiken?

Indien u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zodra u eraan denkt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Propranolol EG

Stop niet met de behandeling, zelfs indien u zich goed voelt, behalve wanneer uw arts u zegt te stoppen. Dit moet geleidelijk gebeuren (afbouwen van de behandeling).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Trombocytopenie (bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging).

Endocriene aandoeningen

Te laag suikergehalte in het bloed (gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen) bij pasgeborenen, zuigelingen, kinderen, oudere patiënten, hemodialyse-patiënten, patiënten die gelijktijdig een antidiabetische behandeling krijgen, patiënten die langdurig vasten en patiënten met chronische leverziekte.

Psychische stoornissen

Depressies, nachtmerries, psychosen en hallucinaties, slaapstoornissen.

Bijsluiter

Zenuwstelselaandoeningen

Hoofdpijn, verwarring, duizeligheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is.

Oogaandoeningen

Gezichtsstoornissen, droge ogen.

Hartaandoeningen

Zoals met andere bètablokkers werden trage hartslag, koude vingers en tenen, enkele gevallen van verslechtering van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) en posturale hypotensie (bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid) waargenomen.

Bij gevoelige patiënten: uitlokken van atrioventriculair blok (bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen).

Bloedvataandoeningen

Claudicatio intermittens (perioden van mank lopen en pijn in de benen) en fenomeen van Raynaud (gevoelloosheid en krampen in de vingers, gevolgd door warmtegevoel en pijn) (gevoelige patiënten).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Bronchospasmen (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen) kunnen optreden bij astmapatiënten of bij patiënten met een voorgeschiedenis van astmatische klachten (soms met fatale afloop).

Maagdarmstelselaandoeningen

Diarree, misselijkheid.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Kaalhoofdigheid, psoriasiforme huidreacties, verergeren van psoriasis, erythemateuze huiduitslag (roodheid van de huid).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vermoeidheid en/of traagheid (dikwijls van voorbijgaande aard).

Een toename in A.N.F. (Antinucleaire factor) werd waargenomen, hoewel de klinische betekenis nog niet duidelijk is; geïsoleerde gevallen van een myasthenia gravisachtig syndroom of verergering van myasthenia gravis (bepaalde vorm van spierzwakte) werden gerapporteerd.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Propranolol EG?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C).

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Propranolol EG?

Propranolol EG 40 mg tabletten:

De werkzame stof is 40 mg propranololhydrochloride.

De andere stoffen zijn D-mannitol, gelatine, alginezuur, stearinezuur, magnesiumstearaat.

Propranolol EG Retard 160 mg capsules met verlengde afgifte:

De werkzame stof is 160 mg propranololhydrochloride.

De andere stoffen zijn maïszetmeel, sucrose, povidone, ethylcellulose, talk, gelatine, titaniumdioxide (E171).

Zie rubriek 2 “Propranolol EG Retard 160 mg capsules met verlengde afgifte bevat sucrose” voor meer informatie.

Hoe ziet Propranolol EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Propranolol EG 40 mg tabletten:

Tabletten.

Blisterverpakking met 50 of 100 tabletten – unit dose.

Propranolol EG Retard 160 mg capsules met verlengde afgifte:

Capsules met verlengde afgifte.

Blisterverpakking met 28, 56, 60 of 100 capsules met verlengde afgifte – unit dose.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel

Fabrikant

Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

Propranolol EG 40 mg tabletten

BE135782

Propranolol EG Retard 160 mg capsules met verlengde afgifte

BE135773

Afleveringswijze: Op medisch voorschrift

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd/herzien in 01/2016 / 12/2015