

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Quinapril EG 5 mg, 10 mg, 20 mg filmomhulde tabletten
Quinapril

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Quinapril EG en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wanneer mag u Quinapril EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Quinapril EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Quinapril EG?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Quinapril EG en waarvoor wordt het ingenomen?

Quinapril EG bevat het werkzame bestanddeel quinapril. Quinapril EG behoort tot een geneesmiddelen-categorie bekend onder de naam antihypertensiva. Antihypertensiva zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van hoge bloeddruk.

Quinapril EG is een bloeddrukverlagend middel, een zogenaamde angiotensineconversie-enzymremmer (ACE-remmer). ACE-remmers verlagen de bloeddruk door een stof genaamd angiotensine, die de bloedvaten vernauwt, te blokkeren. Doordat het angiotensine geblokkeerd wordt, kunnen de bloedvaten ontspannen, waardoor de bloeddruk daalt.

Quinapril EG wordt gebruikt voor de behandeling van:

- hoge bloeddruk
- congestief hartfalen (wanneer het hart niet genoeg bloed door het lichaam kan pompen)

2. Wanneer mag u Quinapril EG niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Quinapril EG niet innemen?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
- U bent allergisch voor een andere ACE-remmer.
- U hebt ernstige allergische reacties (overgevoelighedsreacties) ontwikkeld na een eerdere behandeling met een ACE-remmer. Symptomen van ernstige allergische reacties zijn: zwelling van de ledematen, het gezicht, de lippen, de tong en/of keel (angio-oedeem) met slik- of ademhalingsmoeilijkheden.
- U lijdt aan erfelijk angio-oedeem of angio-oedeem waarvan de oorzaak niet bekend is.
- U bent meer dan 3 maanden zwanger. (Het is ook beter om Quinapril EG te vermijden in het begin van de zwangerschap – zie rubriek over zwangerschap).

- U hebt een belemmering in het hart die de bloedstroom uit het hart vertraagt (uitstroomobstructie van de linkerhartkamer).
- U heeft diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een bloeddrukverlagend geneesmiddel dat aliskiren bevat.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Quinapril EG?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Quinapril EG inneemt.

Als u denkt dat u zwanger bent (of het zou kunnen worden), moet u uw arts op de hoogte brengen. Quinapril EG is niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap en mag niet ingenomen worden als u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby als het in dit stadium wordt gebruikt (zie rubriek over zwangerschap).

Informeer uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt als u momenteel lijdt of in het verleden geleden hebt aan:

- bepaalde hartziekten, bijv.
 - ischemische hartziekte (waarbij uw hartspier onvoldoende bloed krijgt)
 - vernauwing van uw hartkleppen (aorta- of mitralisstenose)
 - verdikte hartspier (hypertrofische cardiomyopathie)
- ischemische cerebrovasculaire ziekte (waarbij uw hersenen onvoldoende bloed krijgen)
- nierziekte
- vernauwing van de nierslagaders (renale arteriële stenose)
- collageen-vasculaire ziekte (een ziekte die de bloedvaten aantast)
- diabetes
- hartfalen
- een soort van hoge bloeddruk die men ernstige renineafhankelijke hypertensie noemt
- leverfalen
- extreem lage hoeveelheden witte bloedcellen (neutropenie/agranulocytose)
- hoge concentratie kalium in het bloed
- overgevoeligheidsreacties met of zonder voorgeschiedenis van allergie of bronchiaal astma

Wees extra voorzichtig en informeer uw arts als u één van de volgende behandelingen krijgt:

- hemodialyse (wanneer uw bloed gezuiverd wordt van afvalstoffen met behulp van een dialysemachine)
- andere soorten ingrepen of anesthesie (verdoving)
- een techniek genaamd aferese (om vet uit uw bloed te halen)
- niertransplantatie
- desensibilisatiebehandeling (wanneer u kleine hoeveelheden van een stof toegediend krijgt waarvoor u allergisch bent, met de bedoeling om de negatieve effecten te helpen verminderen, bijv. wespsteken)
- als u een van de volgende geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk inneemt:
 - een angiotensine II-receptorantagonist (ARB's) (ook bekend als sartans – bijvoorbeeld valsartan, telmisartan, irbesartan), in het bijzonder als u diabetes-gerelateerde nierproblemen heeft
 - aliskiren

Uw arts zal mogelijk regelmatig uw nierfunctie, bloeddruk en het aantal elektrolyten (bv. kalium) in uw bloed controleren.

Zie ook de informatie in de rubriek “Wanneer mag u Quinapril EG niet innemen?”.

Symptomatische lage bloeddruk

In sommige gevallen kan Quinapril EG tot gevolg hebben dat uw bloeddruk te veel daalt. De kans hierop is groter als u gedehydrateerd bent (uw lichaam heeft niet de hoeveelheid water en vloeistof die het zou moeten hebben) bijv. als gevolg van diarree en braken. In dat geval zal uw arts het nodige doen om uw bloeddruk weer op een veilig niveau te krijgen.

Etnische verschillen

Als u van het zwarte ras bent, is Quinapril EG mogelijk minder doeltreffend in het verlagen van uw bloeddruk. Patiënten van het zwarte ras hebben meer kans op angio-oedeem (zwellen van het gezicht, de tong of keel en huidreacties) dan patiënten van een ander ras.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Quinapril EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

U moet bijzonder voorzichtig zijn als u ook één van de volgende geneesmiddelen neemt:

- **Tetracyclines** (een soort antibioticum) **en andere geneesmiddelen die een interactie aangaan met magnesium**: Quinapril EG vermindert de activiteit van deze geneesmiddelen. Deze combinatie moet worden vermeden.
- **Kaliumsparende diuretica** (geneesmiddelen die de hoeveelheid water in uw urine verhogen) of **kaliumsupplementen** (vitaminen en mineralen die kalium bevatten): Quinapril EG kan de activiteit van deze stoffen verminderen.
- **Diuretica** (geneesmiddelen die de hoeveelheid water in uw urine verhogen): Eerdere behandeling met deze geneesmiddelen kan de werking van Quinapril EG op uw bloeddruk versterken. Wanneer Quinapril EG wordt gebruikt voor de behandeling van chronisch hartfalen is het waarschijnlijk dat het de effecten van furosemide (een lisdiureticum) vermindert.
- **Andere geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen**: Deze geneesmiddelen kunnen het effect van Quinapril EG op de bloeddruk versterken.
- **Lithium** (een geneesmiddel gebruikt voor mentale aandoeningen): Quinapril EG kan de toxiciteit (de bijwerkingen) van lithium versterken.
- **Tricyclische antidepressiva** (voor de behandeling van depressie) en **antipsychotica** (tegen psychische ziekte): Deze kunnen de activiteit van Quinapril EG versterken.
- **Niet-steroidale anti-inflammatoire geneesmiddelen** (geneesmiddelen tegen reuma): Deze kunnen de activiteit van Quinapril EG verminderen. Ze kunnen ook nierproblemen veroorzaken.
- **Acetylsalicylzuur**: Als u hoge dosissen acetylsalicylzuur neemt (meer dan 325 mg) is de kans groot dat de effecten van Quinapril EG hierdoor verminderd worden.
- **Sympathomimetica** (een soort stimulerend middel, zoals clonidine en dobutamine): Deze kunnen de activiteit van Quinapril EG verminderen.
- **Geneesmiddelen tegen diabetes (suikerziekte)**: De werking van deze geneesmiddelen kan worden versterkt door Quinapril EG.
- **Trimethoprim**: Een behandeling met trimethoprim en Quinapril EG tegelijk kan sterk verhoogde kaliumconcentraties in uw bloed veroorzaken.
- **Antacida**: Antacida verminderen het effect van Quinapril EG.
- **Alcohol, anesthetica** (breng uw arts op de hoogte als u een operatie moet ondergaan) en **narcotica** (sterke pijnstillers of slaapmiddelen): Deze middelen kunnen het effect van Quinapril EG op de bloeddruk versterken.
- **Allopurinol** (voor de behandeling van chronische jicht), **cytostatica** (voor de behandeling van kanker), **immunosuppressiva** (voor de behandeling van auto-immuunziekten of gebruikt om

afstoting van getransplanteerde organen te voorkomen), **corticosteroïden** (ontstekingsremmers) of **procaïnamide** (om een onregelmatige hartslag te corrigeren): Deze geneesmiddelen kunnen de kans op leukopenie (abnormale afname van het aantal witte bloedcellen) verhogen.

- **Goud:** Nitritoïde reacties (de symptomen zijn onder meer roodheid van het gezicht, misselijkheid, braken en lage bloeddruk) zijn in zeldzame gevallen gemeld bij patiënten die met injecteerbaar goud en een ACE-remmer werden behandeld.

Uw arts kan uw dosis aanpassen en/of andere voorzorgsmaatregelen nemen:

- als u een angiotensine II-receptorantagonist (ARB) of aliskiren inneemt (zie ook de informatie in de rubrieken “Wanneer mag u Quinapril EG niet innemen?” en “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Quinapril EG?”).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Quinapril EG kan met of zonder eten ingenomen worden.

Alcohol kan de werking van Quinapril EG verhogen en uw bloeddruk verlagen tot een te laag niveau.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Als u denkt dat u zwanger bent (of het zou kunnen worden), moet u uw arts op de hoogte brengen. Normaal gezien zal uw arts u aanraden te stoppen met de inname van Quinapril EG voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent, en u de raad geven een ander geneesmiddel in te nemen in de plaats van Quinapril EG. Quinapril EG wordt niet aangeraden in het begin van de zwangerschap, en u mag het geneesmiddel niet innemen wanneer u meer dan 3 maanden zwanger bent, aangezien het ernstige schade kan toebrengen aan uw baby als u het nog gebruikt na de derde maand van de zwangerschap.

Borstvoeding

Informeer uw arts als u borstvoeding geeft of binnenkort met borstvoeding wil starten. Het geven van borstvoeding aan pasgeboren baby's (de eerste weken na de geboorte) en vooral aan te vroeg geboren baby's is af te raden wanneer u Quinapril EG neemt.

Wanneer het gaat om een oudere baby dient uw arts u te adviseren over de voordelen en risico's van de inname van Quinapril EG terwijl u borstvoeding geeft, in vergelijking met andere behandelingen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Tijdens een behandeling met Quinapril EG kan duizeligheid of vermoeidheid optreden. Rijd niet en gebruik geen machines als u deze symptomen vertoont.

3. Hoe neemt u Quinapril EG in?

Neem Quinapril EG altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als uw arts u gezegd heeft dat u een halve dosis moet innemen, kunt u de tabletten op de breuklijn in tweeën breken.

Quinapril EG kan met of zonder eten ingenomen worden. De tabletten moeten met een slok water ingenomen worden.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Quinapril EG bij kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt niet aanbevolen.

Gebruik bij volwassenen:

Als u Quinapril EG alleen (monotherapie) inneemt tegen hoge bloeddruk

Uw dosis kan worden aangepast naargelang uw respons. Als u zich na 3 tot 4 weken niet beter voelt, kan uw arts uw dosis verhogen. Quinapril EG wordt meestal eenmaal daags ingenomen, hoewel het mogelijk is dat u het tweemaal daags moet innemen.

	Hoeveelheid [mg]	Quinapril EG filmomhulde tabletten		
		5 mg [dagelijks aantal tabletten]	10 mg [dagelijks aantal tabletten]	20 mg [dagelijks aantal tabletten]
Aanvangsdosis	10	2	1	½
Onderhoudsdosis	20-40	4-8	2-4	1-2
Maximumdosis	40	8	4	2

Als u Quinapril EG inneemt in combinatie met een diureticum (combinatietherapie)

Wees voorzichtig want u hebt meer kans dat u symptomen van hypotensie (lage bloeddruk) ontwikkelt.

Uw arts kan u vragen om te stoppen met het innemen van uw diureticum, indien mogelijk 2 tot 3 dagen voordat u Quinapril EG begint te nemen.

Als u de inname van uw diureticum niet kunt stopzetten, moet uw eerste dosis 2,5 mg bedragen. Uw dosis dient vervolgens door uw arts aangepast te worden, tot een optimale respons bereikt wordt.

Uw arts zal controleren of uw nieren goed werken en of u de juiste hoeveelheid kalium in uw bloed hebt.

Indien nodig kan uw arts u zeggen dat u uw diureticum weer moet nemen.

Als u Quinapril EG inneemt voor de behandeling van hartfalen

U zult Quinapril EG krijgen naast of in combinatie met een diureticum (plastablet) en/of digitalis (digoxine), een geneesmiddel voor het hart.

U kunt de behandeling starten als ambulante patiënt. Maar als:

- u lijdt aan ernstig of onstabiel hartfalen
 - uw nieren niet goed werken
 - u een laag volume circulerende vloeistof (plasma) hebt
 - u niet genoeg natrium in uw bloed hebt (zoutdepletie)
 - u een lage bloeddruk hebt [systolische bloeddruk (wanneer de hartkamers samentrekken) van minder dan 90 mm Hg]
 - u Quinapril EG toegediend krijgt samen met andere vaatverwijdende middelen en hoge doses lisdiuretica (meer dan 80 mg furosemide)
 - als u 70 jaar of ouder bent
- dan moet u Quinapril EG in het ziekenhuis toegediend krijgen.

De aanvangsdosis bedraagt 2,5 mg Quinapril EG. Na deze dosis zal uw arts uw bloeddruk meten om na te gaan of die niet te veel daalt.

Uw dosis kan geleidelijk verhoogd worden tot 40 mg per dag (toegediend in twee doses van 20 mg). Een dosis van 10 mg tot 20 mg per dag, toegediend in twee doses per dag, is meestal genoeg om uw ziekte te behandelen.

Het is mogelijk dat u uw dagelijkse dosis in één keer toegediend krijgt als u lijdt aan licht tot matig ernstig hartfalen en uw toestand gedurende ten minste een maand stabiel is met een dagdosis van 20 mg verdeeld over 2 doses.

Uw arts zal uw toestand opvolgen tijdens de eerste twee weken van de behandeling en telkens wanneer u uw dosis Quinapril EG of de dosis van uw diureticum verandert.

Als u lijdt aan een nierziekte:

Uw aanvangsdosis Quinapril EG moet worden verlaagd. Uw dosis Quinapril EG is afhankelijk van hoe goed uw nieren werken. Uw arts zal deze dosis bepalen.

Als uw bloeddruk met Quinapril EG na drie maanden nog niet lager is, kan uw arts u een ander geneesmiddel voorschrijven.

Als u ouder bent dan 65:

Uw behandeling moet worden opgestart met een dosis van 5 mg eenmaal daags.

Heeft u te veel van Quinapril EG ingenomen?

Wanneer u te veel van Quinapril EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245) of bel de spoeddienst. Vergeet niet de verpakking en eventueel resterende tabletten mee te nemen.

Bent u vergeten Quinapril EG in te nemen?

Maak u geen zorgen. Schrap deze dosis gewoon volledig en neem de volgende dosis op het juiste tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Quinapril EG

Stop niet met het innemen van Quinapril EG zonder eerst met uw arts te overleggen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Quinapril EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u:

- symptomen vertoont van angio-oedeem (een levensbedreigende reactie), zoals:
 - gezwollen gezicht, tong of keel
 - moeite met slikken
 - netelroos en ademhalingsmoeilijkheden
- pijn op de borst of een vermoedelijke hartaanval hebt
- een ernstige huidreactie vertoont
- koorts hebt waarvan de oorzaak onbekend is, griepachtige symptomen zoals keelpijn (deze symptomen kunnen wijzen op een verlaagde concentratie witte bloedcellen)
- een gele verkleuring van het wit van het oog of van de huid vertoont, wat een symptoom kan zijn van een ontsteking van de lever (hepatitis)

Quinapril EG kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Raadpleeg uw arts regelmatig zoals verzocht. Dat zal helpen om mogelijke bijwerkingen op te sporen. Informeer uw arts tijdens de routineonderzoeken als u een mogelijke bijwerking vertoont of vermoedt hebt.

Vaak (kan tot 1 op 10 mensen treffen):

- duizeligheid
- lage bloeddruk (hypotensie)
- hoesten
- misselijkheid (nausea)
- braken
- losse stoelgang (diarree)
- hoofdpijn
- vermoeidheid
- te hoge concentratie kalium in het bloed (hyperkaliëmie)
- slaapstoornissen (slapeloosheid)
- abnormale sensaties (paresthesie: tintelingen)
- kortademigheid (dyspneu)
- indigestie (dyspepsie)
- buikpijn (abdominale pijn)
- rugpijn
- spierpijn
- zwakte (asthenie)
- pijn op de borst
- verstopte en lopende neus (rhinitis)
- pijnlijke keel (pharyngitis)
- stijging van de creatinine- en urinezuurconcentratie (afvalstoffen), vooral wanneer Quinapril EG samen met diuretica gebruikt wordt

Soms (kan tot 1 op 100 mensen treffen):

- zenuwachtigheid
- neerslachtigheid (depressie)
- verwardheid
- slaperigheid
- zwakte van de armen, benen of spraakproblemen die symptomen kunnen zijn van een "miniberoerte" (tijdelijke ischemische aanval)
- lui oog (amblyopie)
- oorsuizingen (tinnitus)
- draaierig gevoel of gevoel dat de omgeving ronddraait (vertigo)
- tijdelijk bewustzijnsverlies als gevolg van bloedtekort in de hersenen (syncope)
- abnormale hartslag (hartkloppingen)
- hartkramp (angina pectoris)
- snelle hartslag (tachycardie)
- hartstilstand (asystolie)
- hartaanval (myocardinfarct). Wanneer de bloedtoevoer naar een deel van het hart onderbroken is.
- verwijding van de bloedvaten (vasodilatatie)
- droge keel
- droge mond
- winderigheid (flatulentie)

- zwelling van het gezicht, de lippen, de keel en/of tong (angio-oedeem)
- huiduitslag (exantheem)
- jeuk
- overmatig zweten
- impotentie
- verstoorde nierfunctie
- aanwezigheid van of teveel aan serumeiwitten in de urine (proteïnurie)
- zwelling (gegeneraliseerd of perifeer oedeem)
- koorts
- ontsteking van de luchtwegen van de longen (bronchitis)
- infectie van de bovenste luchtwegen
- infectie van de urinewegen
- ontsteking van de sinussen (sinusitis)

Zelden (kan tot 1 op 1.000 mensen treffen):

- neuropathie (abnormale zenuwfunctie, die symptomen veroorzaakt als pijn, versuffing en abnormale sensaties)
- evenwichtsstoornis
- wazig zicht
- verergering van astma
- longontsteking
- smaakveranderingen
- verstopping
- ontsteking van de tong (glossitis)
- stoornissen in de leverfunctie
- huidaandoening als gevolg van een allergische reactie of infectie (erythema multiforme)
- pemphigus (een huidziekte met vorming van blaren en zweren)
- psoriasisachtige huiduitslag (rode, schilferige plekken op de huid)
- pijnlijke gewrichten

Zeer zelden (kan tot 1 op 10.000 mensen treffen):

- zwelling van de darmwand (angio-oedeem van de dunne darm)
- darmobstructie (ileus)

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- extreem laag aantal witte bloedcellen (neutropenie/agranulocytose)
- laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- afname van het aantal rode bloedcellen waardoor een gele verkleuring van de huid en zwakte of ademnood kunnen optreden (hemolytische anemie)
- ernstige allergische (anafylactoïde) reactie op dit geneesmiddel
- erge huiduitslag waaronder netelroos, ernstige jeuk, blaarvorming, vervelling en zwelling van de huid, ontsteking van de slijmvliezen (Stevens-Johnson-syndroom, toxische epidermale necrolyse)
- ontstoken, schilferachtige huid (exfoliatieve dermatitis),
- haaruitval
- gevoeligheid van de huid voor zonlicht
- huidaandoeningen kunnen gepaard gaan met koorts, ontsteking van de slijmvliezen, ontsteking van de bloedvaten, spierpijn, pijnlijke gewrichten, die eveneens de bloedtestresultaten kunnen beïnvloeden
- beroerte (cerebrovasculair accident).

- flauwte, vooral wanneer men rechtop staat (orthostatische hypotensie)
- vernauwing van de luchtwegen in de longen (bronchospasmen). In individuele gevallen: belemmering van de bovenste luchtwegen door angio-oedeem (mogelijk met fatale afloop)
- ontsteking van de pancreas
- ontsteking van de lever (hepatitis)
- gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht)
- daling van de hoeveelheid hemoglobine (een bloedeiwit)
- afname van het aantal rode bloedcellen
- toename van de leverenzymen
- toename van bilirubine in het bloed

Sommige ACE-remmers veroorzaken:

- borstgroei bij mannen
- ontstoken bloedvaten

Dat kan ook gebeuren met Quinapril EG.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via de website: www.fagg.be. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Quinapril EG?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Quinapril EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Exp". Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in Quinapril EG?

De werkzame stof in dit middel is quinapril.

Elke 5 mg-filmomhulde tablet bevat 5 mg quinapril (als quinaprilhydrochloride).

Elke 10 mg-filmomhulde tablet bevat 10 mg quinapril (als quinaprilhydrochloride).

Elke 20 mg-filmomhulde tablet bevat 20 mg quinapril (als quinaprilhydrochloride).

De andere stoffen in de tabletkern zijn:

Zwaar magnesiumcarbonaat

Watervrij calciumwaterstoffosfaat

Gepregelatiniseerd zetmeel

Natriumcroscarmellose

Magnesiumstearaat

De andere stoffen in het filmomhulsel zijn:

Hypromellose
Hydroxypropylcellulose
Titaniumdioxide (E171)
Macrogol 400
Rood ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Quinapril EG 5 mg, 10 mg, 20 mg filmomhulde tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Quinapril EG 5 mg filmomhulde tabletten zijn ovale, biconvexe, roodbruine tabletten met een breuklijn aan beide zijden en de opdruk 'I' aan één zijde. Afmetingen 4,5 x 8,7 mm.

Quinapril EG 10 mg filmomhulde tabletten zijn ovale, biconvexe, roodbruine tabletten met een breuklijn aan beide zijden en de opdruk 'L' aan één zijde. Afmetingen 5,8 x 11,3 mm.

Quinapril EG 20 mg filmomhulde tabletten zijn ronde, biconvexe, roodbruine tabletten met een breuklijn aan beide zijden en de opdruk 'I' aan één zijde. Diameter 7 mm.

Quinapril EG tabletten kunnen verdeeld worden in gelijke helften.

Quinapril EG tabletten zijn verkrijgbaar als:

- blisterverpakkingen (A/A) met 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98, 100 en 500 (5 x 100) tabletten
- plastic (polypropyleen) tablettencontainer met 250 tabletten en een stof om de tabletten droog te houden (droogmiddel)

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel

Fabrikanten

Actavis ehf. – Reykjavíkurvegur 78 - 220 Hafnafjörður – IJsland

Sanico NV – Veedijk 59 – 2300 Turnhout

STADA Arzneimittel AG - Stadastrasse 2-18 - 61118 Bad Vilbel – Duitsland

Centrafarm Services B.V. - Nieuwe Donk 9 - 4879 AC Etten-Leur - Nederland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Zweden : Kinoprilam 5-10-20-40 mg filmdragerad tablett
België : Quinapril EG 5-10-20 mg filmomhulde tabletten
Finland : Quinapril STADA 5-10-20 mg
Italië : Quinapril EG 5-10-20 mg compresse rivestite con film
Luxemburg : Quinapril EG 5-10-20 mg comprimés pelliculés
Nederland : Quinapril CF 5-10-20 mg, tabletten
Verenigd Koninkrijk : Quinapril 5-10-20-40 mg tablets

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen:

Quinapril EG 5 mg filmomhulde tabletten (blisterverpakking): BE262902

Quinapril EG 5 mg filmomhulde tabletten (tablettencontainer): BE262893

Quinapril EG 10 mg filmomhulde tabletten (blisterverpakking): BE262884

Quinapril EG 10 mg filmomhulde tabletten (tablettencontainer): BE262875

Quinapril EG 20 mg filmomhulde tabletten (blisterverpakking): BE262866

Quinapril EG 20 mg filmomhulde tabletten (tablettencontainer): BE262857

Afleveringswijze: op medisch voorschrift.

Bijsluiter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd/herzien in 07/2015 / 07/2015.